

د اطفالو لپاره د واکسينونو ترسره کول

د والدينو لپاره يو لارښود

دا هغه واکسينونه دي چې ستاسو اطفال ورته اړتيا لري!

د زېږون پرمهال ^{1,2}	تور زېږی	RSV-mAb ¹ مياشتې 0-7
2 مياشتنۍ ^{1,2}	تور زېږی ¹⁻² مياشتې 1-2	RV + پوليو + Hib + PCV + DTaP
4 مياشتنۍ ^{1,2}	تور زېږی ³	RV + پوليو + Hib + PCV + DTaP
6 مياشتنۍ ^{1,2}	تور زېږی ² مياشتې 6-18	RV ⁵ + پوليو ² مياشتې 6-18 + Hib ⁴ + PCV + DTaP + کويډ ⁷ + انفلوینزا ⁶
12 مياشتنۍ او ډېر عمر ^{1,2}	MMR ² مياشتې 12-15	DTaP ² مياشتې 15-18 + PCV ² مياشتې 12-15 + Hib ² مياشتې 6-18 + ميانه ² مياشتې 12-15 + ژېږ زېږی ⁸ مياشتې 12-23 + انفلوینزا ⁸

له خپل ډاکټر يا نرس سره وگورئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو ماشوم ټول واکسينونه په خپل وخت ترلاسه کوي. ډېری وختونه واکسين گډ او په ترکيبي بڼه کېږي ترڅو د ستونو شمېر راکم شي. د خپل ماشوم د واکسينو کارت غوښتنه هرو مرو وکړئ چې د شوي واکسينونو نېټې پکې ليکل شوي وي؛ دا هر ملاقات ته د ځان سره راوړئ.

لته د ناروغيو يو ليست دی چې د واکسينو په پايله کې به يې پروراندې ستاسو ماشوم خوندي وي:

RSV: د تنفسي سنسيشيال وېروس، د سږو شديد عفويت

RV: د روټاويروس عفونيت، د شديد نس ناستي ناروغي

انفلوینزا: د سږو شديد ناروغي

MMR: شری، ممپس، او روبيلا

کويډ 19: شديد او خورا ډېره عفوني ناروغي

ژېږ زېږی: هېپاټايټس ای، د خيگر شديد ناروغي

شری: وارسيلا هم ورته ويل کېږي

تور زېږی: تور زېږی، د ځيگر جدي ناروغي

DTaP: ديفټيريا، تيتانوس (د جامې کلکېدل)، او پيرټوسس (تور ټوخی)

PCV: د سينه بغل واکسين د وينې، سږو، او د مغز شديد عفونيت پر وړاندې خونديتوب وړاندې کوي

Hib: هايوموفيلس انفلوینزا نوع بي، د مغز، ستوني، او د وينې شديد عفونيت

پوليو: پوليو يا گوزن، د شديد گوزن ناروغي

د پورتنی جدول په اړه يادښتونه:

- د اکتوبر څخه تر مارچ پورې، اطفال د زېږون له عمر څخه تر 7 مياشتنۍ پورې ښايي د RSV وځايوي انټي باډي (RSV-mAb) ته اړتيا ولري که چېرې د RSV واکسين د امېندواری پرمهال ترسره شوي نه وي. ځينې عمر لرونکي اطفال د 8 مياشتنۍ څخه تر 19 مياشتنۍ پورې ښايي RSV-mAb ته د هغوی د دوهم RSV موسم پرمهال اړتيا ولري.
- دا د عمر هغه حد دی چې دا واکسين بايد پکې وشي.
- ستاسو ماشوم ښايي د کارول شويو واکسين په پام کې نيولو سره، په 4 مياشتنۍ عمر کې د تور زېږي د واکسين يوه دوز ته اړتيا ونه لري. له خپل ډاکټر يا نرس سره وگورئ.
- ستاسو ماشوم ښايي د کارول شوي واکسينو په پام کې نيولو سره، په 6 مياشتنۍ عمر کې د Hib واکسين يو دوز ته اړتيا ونه لري. له خپل ډاکټر يا نرس سره وگورئ.
- ستاسو ماشوم ممکن د کارول شوي واکسين په پام کې نيولو سره، په 6 مياشتنۍ عمر کې د RV واکسين يو دوز ته اړتيا ونلري. له خپل ډاکټر يا نرس سره وگورئ.
- د 6 مياشتو او ډېر عمر لرونکي ټول ماشومان بايد د هر کال مني يا ژمي کې د انفلوینزا پروراندې واکسين شي.
- د ورکول کېدونکي کويډ 19 واکسين براند په پام کې نيولو سره، ستاسو ماشوم به 2 يا 3 دوزونو ته اړتيا ولري.
- ستاسو ماشوم به د ژېږ زېږي واکسين 2 دوزونو ته اړتيا ولري، چې لږترلږه د 6 مياشتو مهالني واټن په توپير سره ورکول کېږي.



www.immunize.org/catg.d/p4010-pus.pdf

"Immunizations for Babies"

Item P4010-pus Pashto (12/8/2023)

Pashto translation provided by Fargo Cass Public Health



FOR PROFESSIONALS www.immunize.org / FOR THE PUBLIC www.vaccineinformation.org