

Inmunizaciones para bebés

Guía para padres

¡Estas son las vacunas que necesita su bebé!

Al nacer	HepB
2 meses	HepB _{1-2 meses¹} + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV
4 meses	HepB ² + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV
6 meses	HepB _{6-18 meses¹} + DTaP + PCV + Hib ³ + Polio _{6-18 meses¹} + RV ⁴ + Influenza ⁵ + COVID ⁶
12 meses o más	MMR _{12-15 meses¹} + DTaP _{15-18 meses¹} + PCV _{12-15 meses¹} + Hib _{6-18 meses¹} + Varicela _{12-15 meses¹} + HepA ⁷ _{12-23 meses¹} + Influenza ⁵

Consulte a su médico o al personal de enfermería para asegurarse de que su bebé reciba todas las vacunas a tiempo. En muchas ocasiones, las vacunas se combinan para reducir las inyecciones. No olvide solicitar una cartilla de vacunación con las fechas de las vacunas de su bebé y llévela a cada visita.

Esta es una lista de las enfermedades contra las cuales estará protegido su bebé:

HepB: hepatitis B, una enfermedad seria del hígado

DTaP: difteria, tétanos y tos ferina (coqueluche)

PCV: vacuna conjugada antineumocócica; protege contra una infección grave de la sangre, los pulmones y el cerebro

Hib: *Haemophilus influenzae* tipo b, una infección seria del cerebro, la garganta y la sangre

Polio: poliomielitis; una seria enfermedad paralizante

RV: infección por rotavirus; una enfermedad diarreaica seria

Influenza: una infección seria de los pulmones

MMR: sarampión, paperas y rubéola

COVID-19: una enfermedad muy seria e infecciosa

HepA: hepatitis A, una enfermedad seria del hígado

Varicela: también se conoce como “viruela loca”

Notas del cuadro anterior:

1. El intervalo de edad en el que debe administrarse esta vacuna.
2. Es posible que el bebé no necesite una dosis de la vacuna contra la hepatitis B a los 4 meses de edad, según la vacuna utilizada. Consulte a su médico o al personal de enfermería.
3. Es posible que el bebé no necesite una dosis de la vacuna Hib a los 6 meses de edad, según la vacuna utilizada. Consulte a su médico o al personal de enfermería.
4. Es posible que el bebé no necesite una dosis de la vacuna RV a los 6 meses de edad, según la vacuna utilizada. Consulte a su médico o al personal de enfermería.
5. Todos los niños de 6 meses o más deberán ser vacunados contra la influenza en el otoño o invierno de cada año.
6. Su hijo necesitará 2 o 3 dosis, según la marca de la vacuna contra la COVID-19 administrada.
7. Su hijo necesitará 2 dosis de la vacuna HepA, administradas con al menos 6 meses de diferencia.

