

Chủng ngừa cho trẻ sơ sinh

Hướng dẫn dành cho cha mẹ

Dưới đây là những loại vắc-xin mà con quý vị cần!

Mới sinh	HepB
2 tháng	HepB ^{1-2 tháng¹} + DTaP + PCV + Hib + Bại liệt + RV
4 tháng	HepB ² + DTaP + PCV + Hib + Bại liệt + RV
6 tháng	HepB ^{6-18 tháng¹} + DTaP + PCV + Hib ³ + Bại liệt ^{6-18 tháng¹} + RV ⁴ + Cúm ⁵ + COVID ⁶
12 tháng tuổi trở lên	MMR ^{12-15 tháng¹} + DTaP ^{15-18 tháng¹} + PCV ^{12-15 tháng¹} + Hib ^{6-18 tháng¹} + Thủy đậu ^{12-15 tháng¹} + HepA ⁷ ^{12-23 tháng¹} + Cúm ⁵

Kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị để đảm bảo con quý vị được chích tất cả các loại vắc-xin đúng lịch. Trong nhiều trường hợp, các loại vắc-xin được kết hợp để giảm số lần chích. Hãy nhớ yêu cầu một thẻ ghi chép với ngày chủng ngừa của con quý vị; mang theo thẻ này mỗi lần thăm khám.

Dưới đây là danh sách các bệnh mà con quý vị sẽ được bảo vệ:

HepB: viêm gan B, một bệnh gan nghiêm trọng

DTaP: bạch hầu, uốn ván và ho gà

PCV: vắc-xin liên hợp phế cầu khuẩn bảo vệ chống lại một bệnh nhiễm trùng máu, phổi và não nghiêm trọng

Hib: *Haemophilus influenzae* loại b, một bệnh nhiễm trùng não, họng và máu nghiêm trọng

Bại liệt: bại liệt, một bệnh tê liệt nghiêm trọng

RV: nhiễm vi-rút rota, một bệnh tiêu chảy nghiêm trọng

Cúm: bệnh nhiễm trùng phổi nghiêm trọng

MMR: sởi, quai bị và rubella

COVID-19: một bệnh nghiêm trọng và có khả năng lây nhiễm cao

HepA: viêm gan A, một bệnh gan nghiêm trọng

Thủy đậu: còn được gọi là trái rạ

Lưu ý về bảng trên:

1. Đây là độ tuổi nên chích vắc-xin này.
2. Con quý vị có thể không cần chích vắc-xin Hep B lúc 4 tháng tuổi, tùy theo loại vắc-xin được sử dụng. Hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
3. Con quý vị có thể không cần chích vắc-xin Hib lúc 6 tháng tuổi, tùy theo loại vắc-xin được sử dụng. Hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
4. Con quý vị có thể không cần chích vắc-xin RV lúc 6 tháng tuổi, tùy theo loại vắc-xin được sử dụng. Hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
5. Tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên cần được chích vắc-xin cúm vào mùa thu hoặc mùa đông hằng năm.
6. Con quý vị sẽ cần chích 2 hoặc 3 liều, tùy theo nhãn hiệu vắc-xin ngừa COVID-19 được sử dụng.
7. Con quý vị sẽ cần chích 2 liều vắc-xin HepA, cách nhau ít nhất 6 tháng.

