

# Иммунизация младенцев

## Руководство для родителей

Ниже перечислены вакцины, необходимые вашему ребенку!

При рождении	НерВ
2 месяца	НерВ <sub>1-2 мес.<sup>1</sup></sub> + DТаР + PCV + Hib + Polio + RV
4 месяца	НерВ <sup>2</sup> + DТаР + PCV + Hib + Polio + RV
6 месяцев	НерВ <sub>6-18 мес.<sup>1</sup></sub> + DТаР + PCV + Hib <sup>3</sup> + Polio <sub>6-18 мес.<sup>1</sup></sub> + RV <sup>4</sup> + Influenza <sup>5</sup> + COVID <sup>6</sup>
12 месяцев и старше	MMR <sub>12-15 мес.<sup>1</sup></sub> + DТаР <sub>15-18 мес.<sup>1</sup></sub> + PCV <sub>12-15 мес.<sup>1</sup></sub> + Hib <sub>6-18 мес.<sup>1</sup></sub> + Chickenpox <sub>12-15 мес.<sup>1</sup></sub> + НерА <sup>7</sup> <sub>12-23 мес.<sup>1</sup></sub> + Influenza <sup>5</sup>

Проконсультируйтесь со своим врачом или медсестрой и убедитесь, что ваш ребенок получает все прививки по графику. Многие вакцины объединены вместе, чтобы сократить количество инъекций. Не забудьте попросить карту с датами вакцинации вашего ребенка. Берите ее с собой при каждом посещении врача.

Ниже приведен список заболеваний, от которых будет защищен ваш ребенок:

**Вакцина НерВ:** гепатит В, серьезное заболевание печени

**Вакцина DТаР:** дифтерия, столбняк (спазм жевательных мышц) и коклюш (судорожный кашель)

**Вакцина PCV:** единая вакцина для профилактики пневмококковых инфекций, защищает от серьезной инфекции крови, легких и головного мозга

**Вакцина Hib:** *haemophilus influenzae (гемофильный грипп)* типа В, серьезная инфекция головного мозга, горла и крови

**Вакцина Polio:** полиомиелит, серьезное парализующее заболевание

**Вакцина RV:** ротавирусная инфекция, серьезное заболевание, вызывающее сильную диарею

**Вакцина Influenza:** грипп, серьезная инфекция легких

**Вакцина MMR:** корь, свинка и краснуха

**Вакцина COVID-19:** серьезное и очень заразное заболевание

**Вакцина НерА:** гепатит А, серьезное заболевание печени

**Вакцина Chickenpox:** ветряная оспа, также называется ветрянкой

### Примечания к таблице выше:

1. В таблице указан возрастной диапазон, в котором следует вводить вакцину.
2. В зависимости от используемой вакцины, в возрасте 4 месяцев вашему ребенку может и не потребоваться прививка от гепатита В. Спросите об этом своего врача или медсестру.
3. В зависимости от используемой вакцины, в возрасте 6 месяцев вашему ребенку может и не потребоваться доза вакцины Hib. Спросите об этом своего врача или медсестру.
4. В зависимости от используемой вакцины, в возрасте 6 месяцев вашему ребенку может и не потребоваться доза вакцины RV. Спросите об этом своего врача или медсестру.
5. Все дети в возрасте 6 месяцев и старше должны проходить вакцинацию против гриппа осенью или зимой каждого года.
6. Вашему ребенку потребуется 2 или 3 дозы, в зависимости от марки вакцины против COVID-19.
7. Вашему ребенку потребуется 2 дозы вакцины против гепатита А с интервалом не менее 6 месяцев.

