婴儿免疫接种

家长指南

这些是您宝宝需要接种的疫苗!

出生时 ^{1,2}	乙肝		RSV-mAb¹ 0–7 个月	L											
2 个月 ^{1,2}	乙肝 1-2 个月 ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Polio	+	RV				
4 个月 ^{1,2}	乙肝3	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Polio	+	RV				
6 个月 ^{1,2}	乙肝 6-18 个月 ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib ⁴	+	Polio 6-18 个月 ²	+	RV ⁵	+	流感6	+	新冠肺炎7
12 个月 及以上 ^{1,2}	MMR 12-15 个月 ²	+	DTaP 15-18 个月 ²	+	PCV 12–15 个月 ²	+	Hib 6-18 个月 ²	+	水痘 12-15 个月²	+	甲肝 ⁸ 12-23 个月 ²	+	流感6		

请与您的医生或护士核查,以确保您的宝宝按时接种了所有疫苗。大多数时候,疫苗可以合并,以减少注射次数。请务必索要一张记录卡,上面注明您宝宝接种疫苗的日期;每次就诊时请随身携带。

以下是您的宝宝将受到保护的疾病列表:

乙肝: 乙型肝炎,一种严重的肝脏疾病

DTaP: 白喉、破伤风(锁颚)和百日咳(哮咳)

PCV: 肺炎球菌结合疫苗可预防严重的血液、肺部和脑部感染

Hib: 乙型流感嗜血杆菌,一种严重的脑部、咽喉和血液感染

Polio:脊髓灰质炎/小儿麻痹症,一种严重的瘫痪性疾病

RSV:呼吸道合胞病毒,一种严重的肺部感染疾病

RV: 轮状病毒感染,一种严重的腹泻疾病

流感: 一种严重的肺部感染

MMR: 麻疹、腮腺炎和风疹

新冠肺炎:一种严重的高度传染性疾病

甲肝:甲型肝炎,一种严重的肝脏疾病

水痘: 也称为水痘-带状疱疹病毒

上图备注:

- 1. 从 10 月到次年 3 月, 如果在怀孕期间没有接种 RSV 疫苗, 新生儿到 7 个月大的婴儿可能需要 RSV 预防性抗体 (RSV-mAb)。某些 8-19 月大的婴儿在第二个 RSV 流行季可能需要 RSV-mAb。
- 2. 这是应接种这种疫苗的年龄范围。
- 3. 您的宝宝在4个月时可能不需要接种一剂乙肝疫苗,具体取决于所使用的疫苗。请咨询您的医生或护士。
- 4. 您的孩子在 6 个月时可能不需要接种一剂 Hib 疫苗,具体取决于所使用的疫苗。请咨询您的医生或护士。
- 5. 您的孩子在 6 个月时可能不需要接种一剂 RV 疫苗,具体取决于所使用的疫苗。请咨询您的医生或护士。
- 6. 所有6个月及以上的儿童应在每年的秋季或冬季接种流感疫苗。
- 7. 根据所接种的新冠肺炎疫苗品牌,您的孩子需要接种2或3剂新冠肺炎疫苗。
- 8. 您的孩子将需要接种2剂甲肝疫苗,间隔至少6个月。



