

# 아기를 위한 예방접종

부모를 위한 가이드

이것이 아기에게 필요한 백신입니다!

출생 시	HepB
2개월	HepB <sub>1~2개월<sup>1</sup></sub> + DTaP + PCV + 뇌수막염 + 소아마비 + RV
4개월	HepB <sup>2</sup> + DTaP + PCV + 뇌수막염 + 소아마비 + RV
6개월	HepB <sub>6~18개월<sup>1</sup></sub> + DTaP + PCV + 뇌수막염 <sup>3</sup> + 소아마비 <sub>6~18개월<sup>1</sup></sub> + RV <sup>4</sup> + 인플루엔자 <sup>5</sup> + COVID <sup>6</sup>
12개월 이상	MMR <sub>12~15개월<sup>1</sup></sub> + DTaP <sub>15~18개월<sup>1</sup></sub> + PCV <sub>12~15개월<sup>1</sup></sub> + 뇌수막염 <sub>6~18개월<sup>1</sup></sub> + 수두 <sub>12~15개월<sup>1</sup></sub> + HepA <sup>7</sup> <sub>12~23개월<sup>1</sup></sub> + 인플루엔자 <sup>5</sup>

귀하의 아기가 일정에 따라 모든 예방접종을 받고 있는지 담당 의사 또는 간호사와 확인하십시오. 주사 횟수를 줄이기 위해 백신이 혼합되는 경우가 많습니다. 아기의 백신 접종 날짜가 기재된 기록 카드를 요청해야 합니다. 매 방문 시 이를 지참하십시오.

다음은 귀하의 아기가 보호받을 질병의 목록입니다.

**HepB:** B형 간염, 심각한 간 질환

**DTaP:** 디프테리아, 파상풍(개구장애), 백일해(백일 기침)

**PCV:** 폐렴구균 결합 백신은 심각한 혈액, 폐 및 뇌 감염으로부터 보호함

**뇌수막염(Hib):** 헤모필루스 인플루엔자 B형, 중대한 뇌, 인후 및 혈액 감염

**소아마비:** 중대한 마비성 질환

**RV:** 로타바이러스 감염, 심각한 설사 질환

**인플루엔자:** 중대한 폐 감염

**MMR:** 홍역, 볼거리, 풍진

**COVID-19:** 심각하고 전염성이 높은 질병

**HepA:** A형 간염, 중대한 간질환

**수두:** 바리셀라(varicella)고도 함

## 위의 차트에 대한 참고 사항:

1. 이는 이 백신을 접종해야 하는 연령대입니다.
2. 아기는 사용한 백신에 따라 생후 4개월에 Hep B 백신 접종을 받지 않아도 될 수 있습니다. 담당 의사 또는 간호사와 상의하십시오.
3. 아기는 사용한 백신에 따라 생후 6개월에 뇌수막염 백신 접종을 받지 않아도 될 수 있습니다. 담당 의사 또는 간호사와 상의하십시오.
4. 아기는 사용한 백신에 따라 생후 6개월에 RV 백신 접종을 받지 않아도 될 수 있습니다. 담당 의사 또는 간호사와 상의하십시오.
5. 생후 6개월 이상의 모든 소아는 매년 가을 또는 겨울에 인플루엔자 백신 접종을 받아야 합니다.
6. 자녀는 투여되는 COVID-19 백신의 브랜드에 따라 2회 또는 3회 접종을 받아야 합니다.
7. 자녀는 최소 6개월 간격으로 HepA 백신을 2회 접종받아야 합니다.

