

Immunisations pour bébés

Un guide pour les parents

Voici les vaccins dont votre bébé a besoin !

À la naissance	HepB
2 mois	HepB _{1-2 mois¹} + DTCoq + PCV + Hib + Polio + RV
4 mois	HepB ² + DTCoq + PCV + Hib + Polio + RV
6 mois	HepB _{6-18 mois¹} + DTCoq + PCV + Hib ³ + Polio _{6-18 mois¹} + RV ⁴ + Grippe ⁵ + COVID ⁶
12 mois et plus	ROR _{12-15 mois¹} + DTCoq _{15-18 mois¹} + PCV _{12-15 mois¹} + Hib _{6-18 mois¹} + Varicelle _{12-15 mois¹} + HepA ⁷ _{12-23 mois¹} + Grippe ⁵

Consultez votre médecin ou votre infirmier/ère pour vous assurer que votre bébé reçoit toutes les vaccinations à temps. Souvent, les vaccins sont combinés pour réduire le nombre d'injections. N'oubliez pas de demander un carnet de santé avec les dates des vaccins de votre bébé et apportez-le à chaque visite.

Voici une liste des maladies contre lesquelles votre bébé sera protégé :

HepB : hépatite B, une grave maladie du foie

DTCoq : diphtérie, tétanos, coqueluche

PCV : le vaccin conjugué contre le pneumocoque protège contre une infection grave du sang, des poumons et du cerveau

Hib: *haemophilus influenzae* de type b, une infection grave du cerveau, de la gorge et du sang

Polio : poliomyélite, une maladie paralysante grave

RV : infection à rotavirus, maladie diarrhéique grave

Grippe : une infection pulmonaire grave

ROR : rougeole, oreillons et rubéole

COVID-19 : une maladie grave et hautement infectieuse

HepA : hépatite A, une grave maladie du foie

Varicelle : également appelée petite vérole volante

Remarques sur le tableau ci-dessus :

1. Il s'agit de la tranche d'âge dans laquelle ce vaccin doit être administré.
2. Il se peut que votre bébé n'ait pas besoin d'une dose de vaccin contre l'hépatite B à l'âge de 4 mois, selon le vaccin utilisé. Consultez votre médecin ou votre infirmier/ère.
3. Il se peut que votre bébé n'ait pas besoin d'une dose de vaccin Hib à l'âge de 6 mois, selon le vaccin utilisé. Consultez votre médecin ou votre infirmier/ère.
4. Il se peut que votre bébé n'ait pas besoin d'une dose de vaccin RV à l'âge de 6 mois, selon le vaccin utilisé. Consultez votre médecin ou votre infirmier/ère.
5. Tous les enfants âgés de 6 mois et plus devraient être vaccinés contre la grippe à l'automne ou à l'hiver de chaque année.
6. Votre enfant aura besoin de 2 ou 3 doses, selon la marque du vaccin contre la COVID-19 administré.
7. Votre enfant aura besoin de 2 doses de vaccin contre l'hépatite A, administrées à au moins 6 mois d'intervalle.

