

تطعيمات الأطفال

دليل للوالدين

هذه هي اللقاحات التي يحتاجها طفلك!

عند الولادة	التهاب الكبد الوبائي ب
شهران	التهاب الكبد الوبائي ب شهر إلى شهرين ¹ + الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي + المكورات الرئوية المتقارن + المستدمية النزلية من النوع ب + شلل الأطفال + فيروس الروتا
4 شهور	التهاب الكبد الوبائي ب ² + الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي + المكورات الرئوية المتقارن + المستدمية النزلية من النوع ب + شلل الأطفال + فيروس الروتا
6 شهور	التهاب الكبد الوبائي ب 18-6 شهرًا ¹ + الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي + المكورات الرئوية المتقارن + المستدمية النزلية من النوع ب ³ + شلل الأطفال 18-6 شهرًا ¹ + فيروس الروتا ⁴ + الإنفلونزا ⁵ + كوفيد ⁶
12 شهرًا فأكثر	الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية 15-12 شهرًا ¹ + الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي 18-15 شهرًا ¹ + المكورات الرئوية 15-12 شهرًا ¹ + المستدمية النزلية 18-6 شهرًا ¹ + الجدري المائي 15-12 شهرًا ¹ + التهاب الكبد الوبائي أ ⁷ 12-23 شهرًا ¹ + الإنفلونزا ⁵

راجع طبيبك أو ممرضتك للتأكد من أن طفلك يتلقى جميع اللقاحات في الموعد المحدد. في كثير من الأحيان يتم الجمع بين اللقاحات لتقليل عدد الحقن. تأكد من طلب بطاقة تسجيل تحتوي على تواريخ تطعيمات طفلك؛ وأحضرها معك في كل زيارة.

فيما يلي قائمة بالأمراض التي ستتم حماية طفلك منها:

HepB: التهاب الكبد الوبائي أ، هو مرض خطير يصيب الكبد.	الإنفلونزا: عدوى خطيرة في الرئة
DTaP: الدفتريا والتيتانوس (الكرزاز) والشاهوق (السعال الديكي)	MMR: الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية
PCV: لقاح المكورات الرئوية المتقارن يحمي من عدوى خطيرة بالدم، والرئة، والمخ	كوفيد-19: مرض خطير وشديد العدوى
Hib: المستدمية النزلية من النوع ب، وهي عدوى خطيرة بالدماغ والحلق والدم	HepA: التهاب الكبد أ، وهو مرض خطير في الكبد
Polio: شلل الأطفال، وهو مرض شلل خطير	الجدري المائي: يُسمى أيضًا الحُمق
RV: عدوى فيروس الروتا، وهو مرض إسهال خطير	

ملاحظات بشأن المخطط أعلاه:

- هذه هي الفئة العمرية التي يجب فيها إعطاء هذا اللقاح.
- قد لا يحتاج طفلك إلى جرعة من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب في عمر 4 أشهر، اعتمادًا على اللقاح المستخدم. استشر طبيبك أو ممرضتك.
- قد لا يحتاج طفلك إلى جرعة من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب في عمر 6 أشهر، اعتمادًا على اللقاح المستخدم. استشر طبيبك أو ممرضتك.
- قد لا يحتاج طفلك إلى جرعة من لقاح RV في عمر 6 أشهر، اعتمادًا على اللقاح المستخدم. استشر طبيبك أو ممرضتك.
- يجب تطعيم جميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فما فوق ضد الإنفلونزا في الخريف أو الشتاء من كل عام.
- سيحتاج طفلك إلى جرعتين أو 3 جرعات، اعتمادًا على العلامة التجارية للقاح كوفيد-19 الذي تم إعطاؤه.
- سيحتاج طفلك إلى جرعتين من لقاح التهاب الكبد الوبائي أ، يُعطى بفارق 6 أشهر على الأقل.



www.immunize.org/catg.d/p4010-20.pdf
"Immunizations for Babies"
Item #P4010-20 (Arabic) (11/2022)

Scan for PDF



FOR PROFESSIONALS www.immunize.org / FOR THE PUBLIC www.vaccineinformation.org