

تطعيمات الأطفال

دليل للوالدين

هذه هي اللقاحات التي يحتاجها طفلك!

عند الولادة ^{1,2}	HepB	RSV-mAb ¹ 7-0 شهور								
شهران ^{1,2}	HepB ² شهر إلى شهرين ²	DTaP	PCV	Hib	Polio	RV				
4 شهور ^{1,2}	HepB ³	DTaP	PCV	Hib	Polio	RV				
6 شهور ^{1,2}	HepB ² 18-6 شهور ²	DTaP	PCV	Hib ⁴	Polio ² 18-6 شهور ²	RV ⁵	الإنفلونزا ⁶	كوفيد ⁷		
12 شهرًا فأكثر ^{1,2}	MMR ² 15-12 شهرًا ²	DTaP ² 18-15 شهرًا ²	PCV ² 15-12 شهرًا ²	Hib ² 15-12 شهرًا ²	الجدري المائي ² 15-12 شهرًا ²	HepA ⁸ 23-12 شهرًا ²	الإنفلونزا ⁶			

راجع طبيبك أو ممرضتك للتأكد من أن طفلك يتلقى جميع اللقاحات في الموعد المحدد. في كثير من الأحيان يتم الجمع بين اللقاحات لتقليل عدد الحقن. تأكد من طلب بطاقة تسجيل تحتوي على تواريخ تطعيمات طفلك؛ وأحضرها معك في كل زيارة.

فيما يلي قائمة بالأمراض التي ستتم وقاية طفلك منها:

RSV: الفيروس المخلوي التنفسي، عدوى رئوية خطيرة
RV: عدوى الفيروس العجلية، وهي مرض إسهال خطير
الإنفلونزا: عدوى خطيرة في الرئة
MMR: الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية
كوفيد-19: مرض خطير وشديد العدوى
HepA: التهاب الكبد A، وهو مرض خطير في الكبد
الجدري المائي: يُسمى أيضًا الحُمَاق

HepB: التهاب الكبد البوابي B، هو مرض خطير يصيب الكبد
DTaP: الدفتيريا والتيتانوس (الكزاز) والشاهوق (السعال الديكي)
PCV: لقاح المكورات الرئوية المتقارن يقي من عدوى خطيرة بالدم والرئة والمخ
Hib: المستدمية النزلية من النوع b، وهي عدوى خطيرة بالدماء والحلق والدم
Polio: شلل الأطفال، وهو مرض شلل خطير

ملاحظات بشأن المخطط أعلاه:

- من أكتوبر إلى مارس، قد يحتاج الأطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين الولادة وحتى 7 أشهر إلى الجسم المضاد الوقائي للفيروس المخلوي التنفسي (RSV-mAb) إذا لم يتم إعطاء لقاح الفيروس المخلوي التنفسي أثناء الحمل. قد يحتاج بعض الرضع الأكبر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و19 شهرًا إلى RSV-mAb خلال موسمهم الثاني من VSR.
- هذه هي الفئة العمرية التي يجب فيها إعطاء هذا اللقاح.
- قد لا يحتاج طفلك إلى جرعة من لقاح HepB في عمر 4 أشهر، اعتمادًا على اللقاح المستخدم. استشر طبيبك أو ممرضتك.
- قد لا يحتاج طفلك إلى جرعة من لقاح Hib في عمر 6 أشهر، اعتمادًا على اللقاح المستخدم. استشر طبيبك أو ممرضتك.
- قد لا يحتاج طفلك إلى جرعة من لقاح RV في عمر 6 أشهر، اعتمادًا على اللقاح المستخدم. استشر طبيبك أو ممرضتك.
- يجب تطعيم جميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فما فوق ضد الإنفلونزا في الخريف أو الشتاء من كل عام.
- سيحتاج طفلك إلى جرعتين أو 3 جرعات، اعتمادًا على العلامة التجارية للقاح كوفيد-19 الذي تم إعطاؤه.
- سيحتاج طفلك إلى جرعتين من لقاح HepA، تُعطى بفارق 6 أشهر على الأقل بينهما.

