

د اطفالو لپاره د واکسينونو ترسره کول

د والدينو لپاره يو لارښود

دا هغه واکسينونه دي چې ستاسو اطفال ورته اړتيا لري!

د زېږون پرمهال ^{1,2}	تور زېږی	RSV-mAb ¹ 0-7 مياشتې
2 مياشتنۍ ^{1,2}	تور زېږی ² + DTaP + PCV + Hib + پوليو + RV	
4 مياشتنۍ ^{1,2}	تور زېږی ³ + DTaP + PCV + Hib + پوليو + RV	
6 مياشتنۍ ^{1,2}	تور زېږی ² + DTaP + PCV + Hib ⁴ + پوليو ² + RV ⁵ + انفلوینزا ⁶ + کووید ⁷	
12 مياشتنۍ او ډېر عمر ^{1,2}	MMR ² + DTaP ² 15-18 + PCV ² 12-15 مياشتې ² + Hib ² 12-15 مياشتې ² + ميانه ² 12-15 مياشتې ² + ژېړ زېږی ⁸ 12-23 مياشتې ² + انفلوینزا ⁶	

له خپل ډاکټر يا نرس سره وگورئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو ماشوم ټول واکسينونه په خپل وخت ترلاسه کوي. ډيری وختونه واکسين گډ او په ترکيبي بڼه کېږي ترڅو د ستونو شمېر راکم شي. د خپل ماشوم د واکسينو کارت غوښتنه هرو مرو وکړئ چې د شوي واکسينونو نېټې پکې ليکل شوي وي؛ دا هر ملاقات ته د ځان سره راوړئ.

دلته د ناروغيو يو ليست دی چې د واکسينو په پايله کې به يې پروړاندې ستاسو ماشوم خوندي وي:

RSV: د تنفسي سنسيشيال ويروس، د سږو شديد عفويت

RV: د روټاويروس عفونيت، د شديد نس ناستي ناروغي

انفلوینزا: د سږو شديد ناروغي

MMR: شری، ممپس، او روبیلا

کووید 19: شديد او خورا ډېره عفوني ناروغي

ژېړ زېږی: هېپاټايتس ای، د خيگر شديد ناروغي

شری: وارسېلا هم ورته ويل کېږي

تور زېږی: تور زېږی، د خيگر جدي ناروغي

DTaP: ديفټيريا، تيتانوس (د جامې کلکېدل)، او پيرټوسس (تور ټوخی)

PCV: د سينه بغل واکسين د وينې، سږو، او د مغز شديد عفونيت پر وړاندې خونديتوب وړاندې کوي

Hib: هاپموفيلس انفلوینزا نوع بي، د مغز، ستوني، او د وينې شديد عفونيت

پوليو: پوليو يا گوزن، د شديد گوزن ناروغي

د پورتنی جدول په اړه يادښتونه:

- د اکتوبر څخه تر مارچ پورې، اطفال د زېږون له عمر څخه تر 7 مياشتنۍ پورې ښايي د RSV وقايوي انټي باډي (RSV-mAb) ته اړتيا ولري که چېرې د RSV واکسين د امېندوارۍ پرمهال ترسره شوي نه وي. ځينې عمر لرونکي اطفال د 8 مياشتنۍ څخه تر 19 مياشتنۍ پورې ښايي RSV-mAb ته د هغوی د دوهم RSV موسم پرمهال اړتيا ولري.
- دا د عمر هغه حد دی چې دا واکسين بايد پکې وشي.
- ستاسو ماشوم ښايي د کارول شويو واکسين په پام کې نيولو سره، په 4 مياشتنۍ عمر کې د تور زېږي د واکسين يوه دوز ته اړتيا ونه لري. له خپل ډاکټر يا نرس سره وگورئ.
- ستاسو ماشوم ښايي د کارول شوي واکسينو په پام کې نيولو سره، په 6 مياشتنۍ عمر کې د Hib واکسين يو دوز ته اړتيا ونه لري. له خپل ډاکټر يا نرس سره وگورئ.
- ستاسو ماشوم ممکن د کارول شوي واکسين په پام کې نيولو سره، په 6 مياشتنۍ عمر کې د RV واکسين يو دوز ته اړتيا ونلري. له خپل ډاکټر يا نرس سره وگورئ.
- د 6 مياشتو او ډېر عمر لرونکي ټول ماشومان بايد د هر کال مني يا ژمي کې د انفلوینزا پروړاندې واکسين شي.
- د ورکول کېدونکي کووید 19 واکسين براند په پام کې نيولو سره، ستاسو ماشوم به 2 يا 3 دوزونو ته اړتيا ولري.
- ستاسو ماشوم به د ژېړ زېږي واکسين 2 دوزونو ته اړتيا ولري، چې لږترلږه د 6 مياشتو مهالني واټن په توپير سره ورکول کېږي.

