

Вакцинація для немовлят

Керівництво для батьків

Ці вакцини потрібні Вашій дитині!

При народженні ^{1,2}	HepB RSV-mAb ¹ 0–7 міс										
2 місяці ^{1,2}	HepB 1–2 міс ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Polio	+	RV
4 місяці ^{1,2}	HepB ³	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Polio	+	RV
6 місяців ^{1,2}	HepB 6–18 міс ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib ⁴	+	Polio 6–18 міс ²	+	RV ⁵ + Influenza ⁶ + COVID ⁷
12 місяців і старше ^{1,2}	MMR 12–15 міс ²	+	DTaP 15–18 міс ²	+	PCV 12–15 міс ²	+	Hib 12–15 міс ²	+	Chickenpox 12–15 міс ²	+	HepA ⁸ 12–23 міс ² + Influenza ⁶

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем або медичною сестрою, щоб впевнитись в тому, що Ваша дитина отримує всі вакцинації за графіком. Часто вакцини поєднують, що знизити кількість ін'єкцій. Попросіть видати Вам реєстраційну картку з датами вакцинації Вашої дитини; приносьте її з собою на кожний візит.

Нижче надано перелік захворювань, від яких буде захищена Ваша дитина:

НерВ: гепатит В, серйозна хвороба печінки

DTaP: дифтерія, правець й кашлюк (судомний кашель)

PCV: пневмококова кон'югована вакцина захищає від серйозної інфекції крові, легенів та головного мозку

Hib: Гемофільна інфекція типу b, серйозна інфекція головного мозку, горла та крові

Polio: поліомієліт, серйозне захворювання, що викликає параліч

RSV: респіраторно-синцитіальний вірус, серйозна інфекція легень

RV: ротавірусна інфекція, серйозне захворювання з діареєю

Influenza: грип, серйозне захворювання легень

MMR (КПК): кір, паротит і краснуха

COVID-19: серйозне і високозаразне захворювання

HepA: гепатит А, серйозна хвороба печінки

Chickenpox: вітряна віспа, вітрянка

Примітки до графіку вище:

- З жовтня по березень немовлята з моменту народження до 7 місяців можуть потребувати введення профілактичних антитіл проти RSV (RSV-mAb), якщо вакцину проти RSV не вводили під час вагітності. Деякі доросліші немовлята віком від 8 до 19 місяців можуть потребувати введення RSV-mAb під час їхнього другого сезону RSV.
- Це віковий діапазон, протягом якого слід застосовувати цю вакцину.
- Можливо, Вашому немовляті не потрібно буде доза вакцини НерВ у віці 4 місяців, залежно від застосованої вакцини. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем або медичною сестрою.
- Можливо, Вашому немовляті не потрібна буде доза вакцини проти гемофільної інфекції (Hib) у віці 6 місяців, залежно від застосованої вакцини. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем або медичною сестрою.
- Можливо, Вашому немовляті не потрібна буде доза RV-вакцини у віці 6 місяців, залежно від застосованої вакцини. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем або медичною сестрою.
- Усі діти віком від 6 місяців і старше повинні бути вакциновані проти грипу восени або взимку кожного року.
- Вашій дитині знадобиться 2 або 3 дози, залежно від бренду введеної вакцини проти COVID-19.
- Вашій дитині знадобиться 2 дози вакцини НерА, з мінімальним інтервалом між ними в 6 місяців.

