

¿Cuándo necesitan vacunas los niños y adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	DTaP/Tdap Difteria, tétanos, tos ferina (coqueluche)	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	IPV Polio	PCV Conjugado neumocócico	RV Rotavirus	MMR Sarampión, paperas, rubéola	Varicela Varicela	HepA Hepatitis A	COVID-19	Dengue	VPH Virus del papiloma humano	Men- ACWY	MenB	Influenza Gripe	
													Meningocócica			
Al nacer (a las 24 horas del nacimiento)	✓															
2 meses	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
4 meses	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓										
6 meses	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹										
12 meses	(6-18 meses)	✓ ² (15-18 meses)	✓	(6-18 meses)	✓		✓	✓	✓✓ (2 dosis administradas con 6 meses de separación, generalmente a la edad de 12-23 meses)	✓ ³ La vacuna contra la COVID-19 se recomienda para todas las personas de 6 meses o más					✓ (6 meses o más)	
15 meses																
18 meses																
19-23 meses																
4-6 años		✓		✓				✓								
7-10 años																
11-12 años		✓(Tdap)									✓✓✓ ⁴ La vacuna contra el dengue se recomienda para ciertos niños	✓✓ ^{5,6}	✓			
13-15 años																
16-18 años													✓	✓✓ ^{7,8}		

Una dosis cada otoño o invierno para todas las personas de 6 meses o más. Algunos niños menores de 9 años necesitan 2 dosis; pregúntele al pediatra si su hijo necesita más de 1 dosis.

Se recomienda administrar la vacuna de la influenza cada año a todas las personas de 6 meses o más

- NOTAS**
- 1 Es posible que su hijo no necesite esta dosis, según la marca de la vacuna que use el proveedor de atención médica.
 - 2 Esta dosis de la vacuna DTaP se puede administrar a partir de los 12 meses si han pasado 6 meses desde la dosis anterior.
 - 3 El número de dosis depende de la marca de la vacuna administrada.

- 4 Se recomienda que los niños de 9 a 16 años que viven en Puerto Rico, Samoa Americana, las Islas Vírgenes Estadounidenses, los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palaos, y que han tenido una infección de dengue previa, confirmada por un laboratorio, reciban una serie de 3 dosis de la vacuna contra el dengue.
- 5 La vacuna contra el VPH se administra habitualmente a los 11 o 12 años de edad, pero puede comenzar desde los 9 años.

- 6 Los niños con ciertas afecciones médicas necesitarán una tercera dosis.
- 7 Esta vacuna se puede administrar a adolescentes sanos. También se recomienda para adolescentes con ciertos problemas de salud.
- 8 Es posible que su hijo adolescente necesite una dosis adicional, según lo recomiende el proveedor de atención médica.

