

# Khi nào thì trẻ nhỏ và thanh thiếu niên cần chích ngừa?

Tuổi	HepB Viêm gan B	DTaP/Tdap Bạch hầu, uốn ván, ho gà	Hib Viêm màng não mủ do Haemophilus influenza tuýp b	IPV Bại liệt	PCV Liên hợp phế cầu khuẩn	RV Vi rút rota	MMR Sởi, quai bị, rubella	Vari- cella Thủy đậu	HepA Viêm gan A	COVID-19	Sốt xuất huyết	HPV Vi rút papilom ở người	Men- ACWY	MenB	Cúm
													Viêm màng não cầu khuẩn		
Mới sinh (trong vòng 24 giờ sau khi sinh)	✓														
2 tháng	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
4 tháng	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓									
6 tháng	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓ <sup>1</sup>									✓ (6 tháng trở lên)
12 tháng	(6-18 tháng)		✓	(6-18 tháng)	✓		✓	✓	✓✓						/
15 tháng		✓ <sup>2</sup> (15-18 tháng)	(12-15 tháng)		(12-15 tháng)		(12-15 tháng)	(12-15 tháng)	(2 liều được chích cách nhau 6 tháng thường ở 12-23 tháng tuổi)						
18 tháng															
19-23 tháng									Vắc-xin HepA (2 liều) cũng được khuyến cáo cho trẻ em và thanh thiếu niên chưa được chích ngừa trước đó.	✓ <sup>3</sup> Vắc-xin ngừa COVID-19 được khuyến cáo cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên					
4-6 tuổi		✓		✓			✓	✓							
7-10 tuổi															
11-12 tuổi		✓ (Tdap)									✓✓✓ <sup>4</sup> Vắc-xin ngừa sốt xuất huyết được khuyến cáo cho một số trẻ em nhất định	✓✓ <sup>5,6</sup>	✓		
13-15 tuổi															
16-18 tuổi													✓	✓✓ <sup>7,8</sup>	

Một liều mỗi mùa thu hoặc mùa đông cho tất cả những người từ 6 tháng tuổi trở lên. Một số trẻ dưới 9 tuổi cần chích 2 liều; hãy hỏi bác sĩ của con quý vị xem bé có cần chích hơn 1 liều hay không.

Vắc-xin ngừa cúm được khuyến cáo chích hằng năm cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên

- LƯU Ý**
- Tùy theo loại vắc-xin mà bác sĩ sử dụng, con của quý vị có thể không cần đến liều này.
  - Liều DTaP này có thể được chích sớm khi trẻ được 12 tháng tuổi nếu liều vắc-xin trước được chích cách đây 6 tháng.
  - Số liều là tùy thuộc vào nhãn hiệu vắc-xin được sử dụng.

- Những trẻ từ 9 đến 16 tuổi sống tại Puerto Rico, American Samoa, U.S. Virgin Islands, Liên Bang Micronesia, Cộng Hòa Marshall Islands, và Cộng Hòa Palau, và đã nhiễm sốt xuất huyết được xác nhận bằng xét nghiệm trước đây được khuyến cáo chích liệu trình 3 liều vắc-xin ngừa sốt xuất huyết.
- Vắc-xin HPV được chích thường quy ở tuổi 11 hoặc 12 nhưng có thể bắt đầu ở 9 tuổi.

- Trẻ em có một số tình trạng y tế nhất định sẽ phải chích liều thứ ba.
- Vắc-xin này có thể được chích cho thanh thiếu niên khỏe mạnh. Thanh thiếu niên đang có một số tình trạng sức khỏe nhất định cũng được khuyến cáo chích vắc-xin này.
- Tùy theo ý kiến bác sĩ, con quý vị ở tuổi thanh thiếu niên có thể cần chích liều bổ sung.

