

График проведения прививок для детей и подростков

Возраст	НерВ Гепатит В	DTaP/Tdap Дифтерия, столбняк, коклюш (судорожный кашель)	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> (гемофильная инфекция) типа В	IPV Полиомиелит	PCV Пневмокок- ковая конъю- гирированная вакцина	RV Ротавирус	MMR Корь, свинка, краснуха	Varicella Ветряная оспа	НерА Гепатит А	COVID-19	Лихо- радка Денге	HPV Вирус папилломы человека	Men- ACWY Менингококковая конъю- гатная вакцина	MenB	Influenza Грипп		
При рождении (в течение 24 часов после рождения)	✓																
2 месяца	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
4 месяца	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓											
6 месяцев	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹									✓		
12 месяцев	(6-18 мес.)		✓	(6-18 мес.)	✓		✓	✓	✓✓	Вакцина против COVID-19 рекомендуется всем в возрасте 6 месяцев и старше					✓ (6 мес. и старше)		
15 месяцев		✓ ² (15-18 мес.)	(12-15 мес.)	(12-15 мес.)		✓	✓	(2 дозы вводятся с интервалом в 6 месяцев в возрасте 12-23 месяцев.)								Каждую осень или зиму все люди в возрасте 6 месяцев и старше получают одну дозу. Некоторым детям младше 9 лет может потребоваться 2 дозы. Спросите у врача вашего ребенка, требуется ли ему больше 1 дозы.	
18 месяцев																	
19-23 месяца																	
4-6 лет		✓		✓			✓	✓	Вакцина НерА (2 дозы) также рекоменду- ется ранее не вакциниро- ванным детям и подросткам								
7-10 лет																Прививку против гриппа рекоменду- ется делать каждый год, начиная с возраста 6 месяцев и старше	
11-12 лет		✓ (Tdap)									✓✓✓✓ ⁴ Некоторым детям реко- мендуется вакцина против лихо- радки Денге	✓✓ ^{5,6}	✓				
13-15 лет																	
16-18 лет													✓	✓✓ ^{7,8}			

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Вашему ребенку может и не потребоваться эта прививка, в зависимости от марки вакцины, которую использует ваш лечащий врач.
- 2 Эта доза вакцины DTaP может вводиться уже в возрасте 12 месяцев, если с момента введения предыдущей дозы прошло 6 месяцев.
- 3 Количество доз зависит от марки вакцины.
- 4 Детям в возрасте от 9 до 16 лет, проживающим в Пуэрто-Рико, на Американском Самоа, Американских Виргинских островах, в Федеративных штатах Микронезии, Республике Маршалловых островов и Республике Палау, у которых ранее была диагностирована лабораторно подтвержденная инфекция лихорадки Денге, рекомендуется пройти серию из 3 доз вакцины.
- 5 Вакцину HPV обычно вводят в возрасте 11 или 12 лет, однако ее можно вводить и с возраста 9 лет.
- 6 Детям с определенными заболеваниями потребуются третья доза.
- 7 Эта вакцина вводится здоровым подросткам. Ее также рекомендуют для подростков с определенными заболеваниями.
- 8 В зависимости от рекомендации врача вашему ребенку может потребоваться дополнительная доза.

