

儿童和青少年何时需要接种疫苗？

年龄	HepB 乙型肝炎	RSV- mAb	DTaP/Tdap 白喉、 破伤风、百日咳 (咳嗽)	Hib 乙型流感嗜 血杆菌	IPV 小儿麻 痹症	PCV 肺炎球菌结 合疫苗	RV 轮状病毒	MMR 麻疹、腮腺 炎、风疹	水痘	HepA 甲型肝炎	新冠肺炎 COVID-19	登革热	HPV 人乳头瘤病毒	Men- ACWY 脑膜炎球菌	MenB	流感
出生时	✓	✓ ² (0-7 个月)														
2 个月	✓		✓	✓	✓	✓	✓									
4 个月	✓ ¹		✓	✓	✓	✓	✓									
6 个月	✓		✓	✓ ¹	✓ (6-18 个月)	✓	✓ ¹				✓ ⁴ 建议在 所有年龄 6 个月及以上 的人接种新冠 肺炎疫苗					✓ (6 个月及 以上)
8 个月	(6-18 个月)	✓ ² (8-19 个月)														
12 个月			✓ ³ (15-18 个月)	✓ (12-15 个月)		✓ (12-15 个月)		✓ (12-15 个月)	✓ (12-15 个月)	✓✓ (在 12-23 个 月时常规注射 2 剂, 间隔 6 个月)						
15 个月																
18 个月																
19-23 个月										HepA 疫苗 (2 剂)也被建议 用于既往未接 种的儿童和青 少年						建议为每个 年龄在 6 个月 及以上的人每 年接种流感 疫苗
4-6 岁			✓		✓			✓	✓							
7-10 岁																
11-12 岁			✓(Tdap)									✓✓✓✓ ⁵ 建议为某些儿 童接种登革热 疫苗	✓✓ ^{6,7}	✓		
13-15 岁																
16-18 岁														✓	✓✓ 8, 9, 10	

每个秋季或冬季一剂。有些
年龄不满 9 岁的儿童需要
接种 2 剂; 请问您孩子的
医务人员您的孩子是否需
要接种超过 1 剂疫苗。

备注

- 您的孩子是否需要注射该剂疫苗，取决于您的医务人员使用的疫苗品牌。
- 母亲在妊娠期间未接种 RSV 疫苗且年龄小于 8 个月 0 天的婴儿应在 RSV 流行季节（通常为 10 月至次年 3 月）之前或期间接种 RSV 预防性抗体（RSV-mAb）疫苗。某些高风险儿童（8 至 19 个月）在第二个 RSV 流行季之前需要接种 RSV-mAb。
- 如果自前一剂疫苗接种时间算起已经有 6 个月，最早可在 12 个月大时接种该剂 DTaP。
- 5 岁或以上儿童通常只需要接种一剂。6 月龄至 4 岁儿童的接种次数由疫苗品牌决定。
- 年龄为 9 至 16 岁，居住在波多黎各、美属萨摩亚、美属维尔京群岛、密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛共和国和帕劳共和国，且经实验室确认曾感染登革热的儿童建议接种 3 剂登革热疫苗。
- HPV 疫苗通常在 11 岁或 12 岁时接种，但也可在 9 岁时开始接种。
- 患有特定医学病症的儿童需要接种第 3 剂。
- 健康的青少年可接种该疫苗。对于患有特定健康病症的青少年，也建议接种该剂疫苗。
- 根据您的医务人员的建议，青少年可能需要接种额外剂次。
- 当需要同时接种 MenACWY 和 MenB 疫苗时，可以使用 MenABCWY 联合疫苗。

