

어린이와 십대 청소년은 언제 백신 접종을 받아야 하나?

나이	HepB B형 간염	DTaP/Tdap 디프테리아, 파상풍, 백일해 (백일 기침)	뇌수막염 헤모필루스 인 플루엔자 b형	IPV 소아마비	PCV 폐렴구균 결합	RV 로타바이러스	MMR 홍역, 볼거리, 풍진	수두	HepA A형 간염	COVID-19	덴기열	HPV 인유두종 바이러스	Men- ACWY	MenB	인플루엔자 Flu
													수막구균		
출생 시 (출생 후 24시간 이내)	✓														
2개월	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
4개월	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓									
6개월	✓ (6~18 개월)	✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹									
12개월			✓	✓ (6~18 개월)	✓		✓ (12~15 개월)	✓ (12~15 개월)	✓✓ (생후 12~23 개월 기간에 6개월 간격을 두고 정기적으로 2회 용량 투여)						✓ (6개월 이상)
15개월		✓ ² (15~18개월)	✓ (12~15 개월)		✓ (12~15 개월)										
18개월															
19~23개월										✓ ³ COVID-19 백신은 생후 6개월 이상의 모든 사람에게 권장됩니다.					
4~6세		✓		✓			✓	✓							
7~10세									또한 이전에 백신 접종을 받지 않은 아동과 십대에게도 HepA 백신 (2회 용량)을 권장합니다.						
11~12세		✓(Tdap)									✓✓✓✓ ⁴ 덴기열 백신은 특정 아동에게 권장됩니다.	✓✓✓ ^{5,6}	✓		인플루엔자 백신은 6개월 이상의 모든 사람에게 매년 권장됩니다.
13~15세															
16~18세													✓	✓✓ ^{7,8}	

가을 또는 겨울이 될 때마다 6개월 이상의 모든 아동에게 1회 투여합니다. 9세 미만의 몇몇 아동들은 2회 용량을 투여해야 합니다. 귀 자녀에게 1회 넘는 용량을 투여해야 하는 경우, 귀 자녀의 담당 의료인에게 물어보십시오.

메모 1 귀 자녀는 담당 의료인이 사용하는 백신 브랜드에 따라 이 용량이 필요하지 않을 수 있습니다.
2 이전 용량 투여 후 6개월이 지난 경우 12개월 차에 이 용량의 DTaP를 투여해야 할 수 있습니다.
3 접종 횟수와 가능한 추가 접종 횟수는 백신 브랜드에 의해 결정됩니다.

4 푸에르토리코, 미국령 사모아, 미국령 버진 군도, 미크로네시아 연방, 마셜 군도 및 팔라우 공화국에 거주하는 9~16세의 소아로서 이전에 실험실에서 확인된 덴기열 감염이 있는 경우 덴기열 백신을 3차까지 접종하는 것이 좋습니다.
5 HPV 백신은 보통 11세 또는 12세에 접종하지만 9세에 시작할 수 있습니다.

6 특정 질환이 있는 아동은 세 번째 용량을 투여해야 합니다.
7 이 백신은 건강한 십대 아이에게 접종할 수 있습니다. 또한 특정 건강 문제가 있는 청소년에게도 이 백신을 권장합니다.
8 담당 의료인의 권장에 따라 십대 자녀에게 추가 용량이 필요할 수 있습니다.

