

À quel âge les enfants et les adolescents ont-ils besoin d'être vaccinés ?

Âge	HepB Hépatite B	DTCoq/Tdcoq Diphtérie, tétanos, coqueluche	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> de type B	VPI Polio	PCV Vaccin conjugué antipneumo- coccique	RV Rotavirus	ROR Rougeole, oreillons et rubéole	Vari- celle Varicelle	HepA Hépatite A	COVID-19	Dengue	PVH Virus du papillome humain	Men ACWY	MenB	Grippe Grippe
													Méningococcie		
à la naissance (dans les 24 heures suivant la naissance)	✓														
2 mois	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
4 mois	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓									
6 mois	✓ (6-18 mois)	✓	✓ ¹	✓ (6-18 mois)	✓	✓ ¹									✓ (6 mois et plus)
12 mois			✓ (12-15 mois)		✓ (12-15 mois)		✓ (12-15 mois)	✓	✓						
15 mois		✓ ² (15-18 mois)													
18 mois															
19-23 mois									✓✓ (2 doses administrées systématiquement à 6 mois d'intervalle entre 12-23 mois)	✓ ³ Le vaccin contre la COVID-19 est recommandé pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus					
4-6 ans		✓		✓			✓	✓							
7-10 ans															
11-12 ans		✓ (Tdcoq)									✓✓✓✓ ⁴ Le vaccin contre la dengue est recommandé pour certains enfants	✓✓ ^{5,6}	✓		
13-15 ans															
16-18 ans													✓	✓✓ ^{7,8}	

Une dose chaque automne ou hiver pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus. Certains enfants de moins de 9 ans ont besoin de 2 doses ; demandez au professionnel de santé de votre enfant si votre enfant a besoin de recevoir plus de 1 dose.

Le vaccin antigrippal est recommandé chaque année pour les personnes âgées de 6 mois et plus.

REMARQUES

- 1 Votre enfant pourrait ne pas avoir besoin de recevoir cette dose, selon la marque du vaccin que votre prestataire de soins utilise.
- 2 Cette dose de (DTcoq) peut être administrée dès l'âge de 12 mois si 6 mois se sont écoulés depuis la dose précédente.
- 3 Le nombre de doses sont déterminés par la marque du vaccin administré.
- 4 Il est recommandé aux enfants âgés de 9-16 ans qui vivent à Porto Rico, aux Samoa américaines, aux Îles Vierges américaines, dans les États fédérés de Micronésie, aux Îles Marshall et aux Palaos, et ayant des antécédents d'infection par la dengue confirmée en laboratoire, de recevoir une série de 3 doses de vaccin contre la dengue.
- 5 Le vaccin contre le PVH est systématiquement administré à l'âge de 11 ou 12 ans, mais peut commencer à être administré à l'âge de 9 ans.
- 6 Les enfants souffrant de certains problèmes de santé auront besoin de recevoir une troisième dose.
- 7 Ce vaccin peut être administré à des adolescents en bonne santé. Il est également recommandé aux adolescents souffrant de certains problèmes de santé.
- 8 Votre adolescent peut avoir besoin de recevoir une dose supplémentaire selon la recommandation de votre professionnel de santé.

