

متى يحتاج الأطفال والمراهقون إلى التطعيمات؟

| الإنفلونزا Flu | (MenB) | -Men ACWY | (HPV) فيروس الورم الحليمي البشري | حمى الضنك | كوفيد-19 | (HepA) التهاب الكبد الوبائي أ | الحمى الجديري المائي | MMR الحصبة والتكاف والحصبة الألمانية | RV الفيروس العجلى | PCV المكورات الرئوية المختارن | IPV شلل الأطفال | Hib المستدمية النزلية من النوع ب | DTaP/Tdap الدفتريا والتيتانوس والشاهوق (السعال الديكي) | التهاب الكبد الوبائي ب الوبائي ب | العمر |
|---------------------|-----------|--------------|--|---|---|---|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | ✓ | عند الولادة (خلال 24 ساعة من الولادة) |
| | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | شهران |
| | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 شهور |
| ✓ (6 شهور وأكبر) | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 شهور |
| | | | | | | ✓✓ (جرعتان يتم إعطاؤهما يفصل بينهما مدة 6 أشهر بشكل روتيني في عمر من 12 إلى 23 شهرًا) | ✓ (من 12 إلى 15 شهر) | ✓ (من 12 إلى 15 شهر) | | ✓ (من 12 إلى 15 شهر) | ✓ (من 6 إلى 18 شهرًا) | ✓ (من 12 إلى 15 شهر) | ✓ (من 15 إلى 18 شهرًا) | ✓ (من 6 إلى 18 شهرًا) | 12 شهرًا |
| | | | | | | | | | | | | | ✓ (من 15 إلى 18 شهرًا) | | 15 شهرًا |
| | | | | | | | | | | | | | | | 18 شهرًا |
| | | | | | ✓ يُوصى بإعطاء لقاح كوفيد-19 لكل شخص في عمر 6 أشهر فأكثر | | | | | | | | | | من 19 إلى 23 شهرًا |
| | | | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | من 4 إلى 6 سنوات |
| | | | | | | | | | | | | | | | من 7 إلى 10 سنوات |
| | | ✓ | ✓✓✓ 6.5 | ✓✓✓✓ يُوصى بلقاح حمى الضنك لبعض الأطفال | | | | | | | | | ✓ (لقاح التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي) | | من 11 إلى 12 سنة |
| | | | | | | | | | | | | | | | من 13 إلى 15 سنة |
| | ✓✓ 8.7 | ✓ | | | | | | | | | | | | | من 16 إلى 18 سنة |

جرعة واحدة كل خريف أو شتاء لكل
الأشخاص من عمر 6 شهور فما فوق. يحتاج
بعض الأطفال الأصغر من 9 سنوات إلى
جرعتين: أسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك
عما إذا كان طفلك يحتاج إلى أكثر من
جرعة واحدة.

يُوصى بلقاح الإنفلونزا كل
عام لكل شخص
عمره 6 شهور فأكثر

ملاحظات

- قد لا يحتاج طفلك هذه الجرعة بناءً على الماركة التجارية للقاح الذي يستخدمه مقدم الرعاية الصحية.
- يمكن إعطاء جرعة DTaP هذه مبكرًا عند عمر 12 شهر إذا مضت 6 شهور على الجرعة السابقة.
- يتم تحديد عدد الجرعات من خلال العلامة التجارية للقاح المقدم.
- يُوصى بإعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا الذين يعيشون في بورتوريكو، وساموا الأمريكية، وجزر فيرجن الأمريكية، وولايات ميكرونيزيا المتحدة، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، والذين تأكد مختبريًا إصابتهم سابقًا بحمى الضنك سلسلة مكونة من 3 جرعات من لقاح الضنك.
- يُعطى لقاح HPV بشكل روتيني في سن 11 أو 12 عامًا ولكن يمكن أن يبدأ في سن 9 أعوام.
- سحتاج الأطفال الذين عندهم حالات طبية مُعَيَّنة إلى جرعة ثالثة.
- يمكن إعطاء هذا اللقاح للمراهقين الأصحاء. يُوصى به أيضًا للمراهقين الذين عندهم حالات صحية مُعَيَّنة.
- قد يحتاج المراهق أيضًا إلى جرعة إضافية بناءً على توصية مقدم الرعاية الصحية.



www.immunize.org/catg.d/p4050-20.pdf

"When Do Children and Teens Need Vaccinations?"

Item #P4050-20 (Arabic) (11/2022)

Scan for PDF



FOR PROFESSIONALS www.immunize.org / FOR THE PUBLIC www.vaccineinformation.org